


ご購入前に、チェックしてみましょう

あてはまる

● 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。…………… A <input type="checkbox"/>	使用しないでください。
● 20歳未満である。…………… B <input type="checkbox"/>	使用しないでください。(国内での使用経験がありません。)
● 妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。…………… C <input type="checkbox"/>	使用しないでください。(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
● 妊娠、出産に伴い脱毛している。…………… D <input type="checkbox"/>	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
● 避妊用ピルの使用をやめたことで脱毛している。…………… E <input type="checkbox"/>	
● 頭髮が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。…………… F <input type="checkbox"/>	
● 頭髮以外の体毛(まゆ毛など)が脱毛している。…………… G <input type="checkbox"/>	
● 急激なダイエットにより脱毛してきた。…………… H <input type="checkbox"/>	
● 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。…………… I <input type="checkbox"/>	
● 急激に脱毛している。…………… J <input type="checkbox"/>	
● 髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。…………… K <input type="checkbox"/>	
● 男性である。…………… L <input type="checkbox"/>	使用しないでください。(本品は女性用です。男性の方はリアップシリーズの男性用製品をご使用ください。)
● 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。…………… M <input type="checkbox"/>	きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることがあります。)
● 右図よりも脱毛している。  …………… N <input type="checkbox"/>	使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。)
● 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。…………… O <input type="checkbox"/>	
● 高血圧・低血圧で現在治療を受けている。狭心症等、心臓に障害がある。…………… P <input type="checkbox"/>	使用を控えられることをおすすめします。使用する場合は、 必ず 医師又は薬剤師に相談してください。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
● 薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。高血圧又は低血圧である。心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。…………… Q <input type="checkbox"/>	使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
● 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。…………… R <input type="checkbox"/>	使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)

上記のいずれにも該当しない。または、チェックのついた **N**～**R** について相談済みである。…………… **S**

ご購入いただけます。使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みください。

- 65歳以上の方へ：一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。
- ご不明点は、薬局・薬店の薬剤師または大正製薬119番室までご相談ください。