

SEMPER PRO

- ◆SEMPER PRO 可以预防和缓解因晕车引起的头晕、恶心、头痛等痛苦的症状。
- ◆不仅针对汽车和巴士，也推荐乘坐飞机、摇晃幅度大的船舶、主题公园游乐设施的人群使用。
- ◆1 天服用 1 次就有效果。
- ◆即使出现不适感觉后服用也有效果。

效能

预防及缓和因晕车引起的头晕、恶心、头疼

用法及用量

请按以下用量并配合水或温开水服用。

但是，为预防晕车晕船，在乘车乘船前提前 30 分钟时，请服用。

15 岁以上，1 次 1 片，1 天 1 次

未满 15 岁，不宜服用

注意

请严格遵守规定的用法用量。

药片的取用方法

以指尖用力按压药锭 PTP 包装凸出部位，使铝箔背模破裂后取出药锭服用。（不慎误食包装将可能造成刺伤食道黏膜等意外事故发生）

成分

1 片中

苯佐卡因 100mg

东莨菪碱氢溴酸盐 0.25mg

d-马来酸氯苯那敏 2mg

吡哆醇盐酸盐（维生素 B₆） 10mg

无水咖啡因 20mg

添加剂

二氧化硅，纤维素，D-甘露醇，羟丙基纤维素，羟基乙酸淀粉钠，硬脂酸镁，三氧化二铁，还原麦芽糖水饴，交联羧甲基纤维素钠，食用蓝色 1 号

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群不要服用
未满 15 岁的儿童。
- 服用本药剂的期间，请勿使用下列任何一种医药品
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、肠胃镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类
（会出现嗜睡、视线模糊、异常眩光等症状）

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
老年人。
因药物等出现过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群。
排尿困难
接受以下诊断的人群。
青光眼，心脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒

精神神经系统：头痛

泌尿系统：排尿困难

其他：脸部灼热，异常眩光

- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。

粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

口腔干燥、便秘、腹泻、嗜睡、视线模糊

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 本药剂为了防止光线引起药变质,内袋(铝袋)一旦开封后,保管时请放回盒子中等,置于光线照射不到的场所保管。
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外,即使在使用期限内,开封后请在6个月以内服用。(为了保证质量)

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译,仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译,今后有可能会被修改或变更,恕不另行通知。
- 供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。