

# SEMPER PRO

- ◆SEMPER PRO 預防及緩解動暈症引起的暈眩、噁心、頭痛症狀。
- ◆搭乘汽車、巴士、飛機、搖晃劇烈的船或主題樂園裡的遊樂設施者，均可服用。
- ◆每天 1 次即具效果。
- ◆一感不適立即服用亦具效果。

## 療效

預防及緩和因暈車而產生的頭暈、噁心、頭痛

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量。

不過，為預防動暈症，請於搭乘車船前 30 分鐘服用。

15 歲以上，1 次 1 片，1 天 1 次

未滿 15 歲者，請勿服用

## 注意事項

請務必遵守規定用法、用量。

## 錠劑取出方法

指尖用力按下裝有藥片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的鋁箔再取出服用。(以包裝的狀態直接誤吞，會發生穿破食管粘膜等意外事故)

## 成分

1 片中

對氨基苯甲酸乙酯 100mg

氫溴酸東莨菪鹼 0.25mg

d-縮水蘋果酸氯芬尼拉明 2mg

鹽酸吡哆辛 (維生素 B<sub>6</sub>) 10mg

無水咖啡因 20mg

## 添加劑

二氧化矽，纖維素，D-甘露醇，羥丙基纖維素，羧甲基澱粉鈉，硬脂酸鎂，氧化鐵，還原麥芽糖漿，交聯羧甲基纖維素鈉，食用藍色 1 號

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 下列的人請勿服用  
未滿 15 歲的兒童。
- 在服用本藥劑期間，不要使用下述任何醫藥品  
其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等 (鼻炎用內服藥、過敏用藥等)
- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類  
(可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀)

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
正在接受醫師治療的人。  
孕婦或可能懷孕的人。  
年長者。  
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。  
有下列症狀的人。  
排尿困難  
接受過下列診斷的人。  
青光眼，心臟病
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：發疹、發紅，發癢

精神神經系統：頭痛

泌尿器官：排尿困難

其他：臉發燙，異常目眩

- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
口乾、便秘、腹瀉、嗜睡，視力模糊

### 保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 本藥劑為避免光線造成變質，內袋(鋁箔袋)一經開封後，保存時請收入外盒並置於避免受光線照射之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。(為確保品質)

11

#### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。