

# TOKUHON

Tokuhon 은 염증을 억제하여 통증을 완화해주는 Methyl salicylate, 혈액순환을 개선해주는 Vitamin E, 피부의 염증을 억제해주는 Glycyrrhetic acid 를 배합하여 피부에 자극 없이 근육 염증과 통증을 억제하는 데 적합한 첩부제입니다. 네 귀퉁이 부분을 둥글게 처리해 사용 중에 떼어지지 않게 했습니다.

## 효능 또는 효과

어깨 결림, 요통, 근육통, 근육피로, 관절통, 타박상, 염좌, 동상

## 용법 및 용량

약제면을 덮은 박리지를 벗겨내고, 1 일 수 차례 환부에 붙이십시오.

### 주의

- 소아에게 사용하게 할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오. 또한, 자극이 강하게 느껴질 수 있기 때문에 7 세 미만의 사람에게 사용하는 것은 피하십시오.
- 환부를 청결히 한 후에 사용하십시오.
- 피부가 약한 사람은 같은 곳에 계속해서 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 팔 안쪽 피부가 약한 부분에 작은 조각을 붙여 발진·발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 발생하지 않는 것을 확인한 후 사용하십시오.

## 성분 및 분량

Active ingredients in 100g (0.54m<sup>2</sup>) of ointment

l-멘톨 6.5g

DL-캠퍼 1.1g

살리실산메틸 7.3g

토코페롤아세테이트 1.35g

글리시리진산 0.18g

### 첨가물

산화아연, 디부틸히드록시톨루엔, 생고무, 폴리이소프렌, 에스테르검, 기타 2 성분

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

- 다음의 부위에는 사용하지 말 것

눈 주위, 점막 등

습진, 접촉성 피부염, 상처

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 사용 후, 피부에 발진 및 발적, 가려움, 접촉성 피부염 등의 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 설명문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
- 5~6 일간 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

## 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 개봉 후에는 빨리 사용하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.