

ZENA F-II KATURYOKUEKI

제2류 의약품
비타민 함유 보건 약

◆제나 F - II 활력액(ZENA F-II KATURYOKUEKI)은 피곤함을 날려버리고 싶은 당신을 응원하는 자양강장 미니 드링크제입니다. ◆피곤해도 바로 쉬 수 없는, 힘든 상황 속에서도 분발하고 싶을 때 등, 피곤한 몸을 충전시켜줄 활력이 필요한 분의 영양보급에 매우 효과적입니다. ◆브라질 원산 자양강 장생약인 무이라푸아마를 비롯하여, 인삼, 하수오 등 총 13종류의 생약 추출물(원생약으로서 총 4300mg 상당),타우린, 비타민을 배합한 당사의 독자 적인 처

효능 또는 효과

☆자양강장
☆허약 체질
☆육체 피로·발열성 소모성 질환·식욕 부진·병중 및 병후·영양 장애·임신 수유기 등의 경우의 영양공급

용법 및 용량

성인(15세 이상) 1일 1회 1병(50mL)을 복용하십시오.
15세 미만, 복용하지 말 것

[주의]

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
본제는 생약 성분을 포함하므로 드물게 침전물이 생길 수 있지만, 약효는 변함 없습니다.
잘 흔들어서 복용하십시오.

성분 및 분량

In 1 bottle (50 mL)
Muirapuama Extract-A 15mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Ginseng extract-P 85.8mg (equivalent to 600 mg of the crude drug)
Polygonum tincture 0.76 mL (equivalent to polygonum root 250 mg)
Rehmannia Root Extract-A 150mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Japanese Angelica Root Fluid Extract S 0.05mL (equivalent to 50 mg of the crude drug)
Lycium Fruit Fluid Extract-A 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Poria Sclerotium extract 9.6mg (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Cinnamon Bark Fluid Extract 0.15mL (equivalent to 150 mg of the crude drug)
Astragalus Root Fluid Extract A 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Glycyrrhiza Extract 37.5mg (equivalent to 150 mg of the crude drug)
Polygonatum Rhizome Fluid Extract 0.3mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Antler Velvet Tinctures 1.08mL (equivalent to 300 mg of the crude drug)
Epimedium Herb extract 100mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 500mg
Riboflavin sodium phosphate 5mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
Anhydrous caffeine 50mg

첨가물

Sugar,D-Sorbitol ,Sodium benzoate,,Butyl parahydroxybenzoatePolyoxyethylene hydrogenated castor oil,Povidone ,citric acid,Sodium citrate,Caramel,flavor,alcohol (not more than 1.0mL)

[주의]

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 Vitamin B2가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

●복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판 매자와 상담할 것

피부:

발진

소화기:

위부 불쾌감

●복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

설사

●한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..